



active+med

Gebrauchsanweisung. Bitte aufmerksam lesen!

HALSTABLETTEN

Medizinprodukt – wohltuend für Mund- und Rachenschleimhaut

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Zusammensetzung:

1 Halstablette enthält 1 mg Aluminiumkaliumsulfat 12 H₂O.

Sonstige Bestandteile: Sorbitol, Magnesiumstearat, Aroma.

Die Halstabletten sind wohltuend für die Mund- und Rachenschleimhaut.

Hinweise:

Patienten mit bekannter Zuckerunverträglichkeit (z. B. Fructoseintoleranz), Morbus Alzheimer, Parkinsonsyndrom sowie dialysepflichtige Personen sollen **active med Halstabletten** nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

In sehr seltenen Fällen kann das enthaltene Sorbitol abführend wirken.

Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte in diesen Fällen vor der Anwendung von **active med Halstabletten** Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren lutschen bis zu 8 x täglich 1 Tablette.

Kinder unter 4 Jahren sollten **active med Halstabletten** nicht anwenden, um ein eventuelles Verschlucken zu vermeiden.

Tritt nach 3-tägiger Anwendung keine Besserung ein, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Verfallsdatum und Lagerung:

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25° C zu lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!



SANKT PIRMIN®
Naturprodukte GmbH
Eltviller Straße 2a
D-55218 Ingelheim



Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

☎ +49 6132 898684
info@sanktpirmin.de

Stand der Information: Mai 2012





active+med

Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement les instructions !

COMPRIMÉS POUR LA GORGE

Dispositif médical – bienfaisant pour la muqueuse bucco-pharyngée

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes ; elles contiennent des informations importantes, à respecter pendant l'utilisation de ce dispositif médical.

Composition :

1 comprimé pour la gorge contient 1 mg de sulfate d'aluminium et de potassium 12 H₂O.

Autres composants : sorbitol, stéarate de magnésium, arôme.

Les comprimés pour la gorge sont bienfaisants pour la muqueuse bucco-pharyngée.

Remarques :

Les patients présentant une intolérance connue au sucre (par ex. intolérance au fructose), une maladie d'Alzheimer, un syndrome de Parkinson, ainsi que les personnes sous dialyse ne doivent consommer les comprimés pour la gorge active med qu'après en avoir parlé avec leur médecin.

Dans de rares cas, le sorbitol contenu dans les comprimés peut présenter un effet laxatif.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Les données d'étude relatives à l'utilisation de ce dispositif médical pendant la grossesse et l'allaitement sont insuffisantes.

C'est pourquoi il convient dans de tels cas d'en parler avec son médecin avant toute utilisation des comprimés pour la gorge active med.

Posologie et mode d'administration :

1 comprimé à sucer 8 fois par jour pour les adultes et les enfants dès 4 ans.

Il est déconseillé de donner les comprimés pour la gorge active med aux enfants de moins de 4 ans, afin d'éviter qu'ils ne s'étouffent.

Adressez-vous à votre médecin si aucune amélioration ne survient après 3 jours d'utilisation.

Date d'expiration et conservation :

Date d'expiration est indiquée sur l'étui et le blister. Ne consommez plus ces comprimés après cette date !

Les comprimés à sucer doivent être conservés dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 25 °C.

Tenir hors de portée des enfants !



SANKT PIRMIN®
Naturprodukte GmbH
Eltviller Straße 2a
D-55218 Ingelheim



N'hésitez pas à nous contacter pour toute question :

☎ +49 6132 898684
info@sanktpirmin.de

Mise à jour de l'information : mai 2012

active+med

Istruzioni per l'uso. Leggere con attenzione!

PASTIGLIE PER LA GOLA

Dispositivo medico – azione benefica sulla mucosa orale e faringea.

Leggere con attenzione le seguenti istruzioni per l'uso, perché contengono importanti informazioni per l'uso di questo dispositivo medico.

Composizione:

1 pastiglia per la gola contiene 1 mg di solfato di alluminio e potassio 12 H₂O.

Eccipienti: sorbitolo, magnesio stearato, aroma.

Le pastiglie per la gola hanno un'azione benefica sulla mucosa orale e faringea.

Avvertenze:

I pazienti con intolleranza nota agli zuccheri (es. intolleranza al fruttosio), i soggetti affetti da morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson e i pazienti che si sottopongono a dialisi possono assumere active med pastiglie per la gola solo dopo aver consultato il medico.

In casi molto rari, il sorbitolo contenuto nelle pastiglie per la gola può avere un'azione lassativa.

Uso in gravidanza e durante l'allattamento:

Non sono state eseguite sufficienti analisi sull'uso di questo dispositivo medico in gravidanza e durante l'allattamento. In questi casi, pertanto, consultare il medico prima di assumere active med pastiglie per la gola.

Dosaggio e modo d'uso:

Gli adulti e i bambini a partire dai 4 anni possono succhiare 1 pastiglia fino a 8 volte al giorno.

I bambini sotto i 4 anni non devono usare active med pastiglie la gola per evitare il pericolo che le inghiottiscano.

Se dopo 3 giorni di uso non si nota alcun miglioramento, si deve consultare un medico.

Data di scadenza e conservazione:

La data di scadenza è stampata sull'astuccio e sul blister.

Non assumere le pastiglie dopo la data di scadenza indicata!

Conservare le pastiglie in luogo asciutto e a temperatura non superiori a 25 °C.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini!



SANKT PIRMIN®
Naturprodukte GmbH
Eltviller Straße 2a
D-55218 Ingelheim



Siamo a disposizione per eventuali domande.

☎ +49 6132 898684
info@sanktpirmin.de

Data dell'ultima revisione: Maggio 2012

